

- p. 3 チャマダラセセリ
Bremer et Grey, 1852 → Bremer et Grey, 1853
1: 6 → 1: 61
- p. 4 ヒメチャマダラセセリ
Type locality “[Finland]” → “Malva, Althaea”(Sweden)
Note 以下を削除
- p. 4 ギンイチモンジセセリ
Bremer et Grey, 1852 → Bremer et Grey, 1853
- p. 4 タカネキマダラセセリ属
Lederer, 1852 → Lederer, 1853
- p. 4 カラフトタカネキマダラセセリ
Meigen, 1830 → Meigen, 1829
- p. 5 コチャバネセセリ
melancolica → *melancholica*
- p. 7 アサヒナキマダラセセリ
Bremer et Grey, 1852 → Bremer et Grey, 1853
- p. 7 コキマダラセセリ
Bremer et Grey, 1852 → Bremer et Grey, 1853
tochrana Rühl, 1895, in Rühl → *tochrana* Heyne, 1895, in Rühl
- p. 8 オオチャバネセセリ
分布追加 佐渡島
備考追加 対馬での近年の記録は途絶えている.
- p. 9 ヒメイチモンジセセリ
1878: 686 → 1878: 688
- p. 9 イチモンジセセリ
Bremer et Grey, 1852 → Bremer et Grey, 1853
- p. 12 ウスバシロチョウ
原記載文献訂正

Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou **39** (Pt 1) (1): 189 (*Parnassius*).

p. 12 ウスバキチョウ

Ménétrières, [1851] → Ménétrières, 1850

p. 16 ミヤマカラスアゲハ

jutanus Ishikawa, 1882 → *jutanus* Fenton, 1882, in Ishikawa,

分布追加 奄美 (奄美大島)

備考追加 奄美大島と石垣島の記録は. . .

p. 17 キアゲハ

mikado Pagenstecher, 1875 → *micado* Pagenstecher, 1874

p. 19 アゲハ

ajax の項 Nom. Oblitum. → Suppressed Name

p. 22 エゾヒメシロチョウ

最初の 4 行を下記のように追加変更

morsei (Fenton, 1882) エゾヒメシロチョウ

Fenton, March 1882, in Ishikawa, *Papilio* **2**: 35, figs 5, 6, 7 (*Leucophasia*). Type locality: “Hokkaido”.

subsp. *morsei* (Fenton, 1882)

Fenton, March 1882, in Ishikawa, *Papilio* **2**: 35, figs 5, 6, 7 (*Leucophasia*). Type locality: “Hokkaido”.

= *morsei* Fenton, [April 1882], in Butler, *Proc. zool. Soc. Lond.* **1881**: 849, 855 (*Leptosia*). Type locality: “Iburi”.

p. 23 キタキチョウ

mariesi → *mariesii*

分布追加 北海道

Distribution 追加 Hokkaido*

備考追加 北海道の記録は迷蝶または人為的移入とされる。

p. 23 ツマグロキチョウ

備考追加 (2014. 12. 20)

東北地方およびトカラ列島→東北地方, 伊豆(八丈島)およびトカラ列島

p. 24 スジボソヤマキチョウ

subsp. *niphonica* Verity, 1909 からの 2 行を下記のように追加変更

subsp. *niphonica* Bollow, 1930

Bollow, 1930, in Seitz, *Grossschmett. Erde Suppl.* **1**: 106 (*Gonepteryx*). Type locality: “Fusiyama [Fujiyama]”. Note: raised to subspecific rank.

= *niphonica* Verity, 1909, *Rhop. Palaearc.*: 280 (f. of *Gonepteryx aspasia* var. *acuminata*). Type

locality: “Fusi yama [Fujiyama]”.

p. 25 ダイダイモンキチョウ

Verity, 1909 → Verity, 1908

266, pl. 46, figs 22-25 → pl. 46, figs 22-25

追加 : Note: プレート部分は 1908 年, 本文は 1909 年の発行.

p. 28 クモガタシロチョウ 最初の 3 行を下記のように追加変更

indra (Moore, 1857) クモガタシロチョウ

Moore, 1857, *Proc. zool. Soc. Lond.* **1857**: 103, pl. 44, fig. 5 (*Pieris*). Type locality “Darjeeling”.

p. 29 ナミエシロチョウ

分布追加 大隈 (屋久島)

p. 32 エゾシロチョウ

分布追加 本州 (青森県)

備考追加 青森県の記録は迷蝶または人為的な移入とされる.

p. 34 ムラサキツバメ

分布追加 本州 (山形県)

備考追加 青森県, 山形県および. . .

p. 39 メスアカミドリシジミ

luxurianus → *luxurians*

p. 41 トラフシジミ

分布追加 伊豆(八丈島), 八重山(石垣島)

備考追加 伊豆(八丈島), 八重山(石垣島)の記録は迷蝶あるいは迷蝶に由来する一時発生とされている.

p. 41 タイワンアサギマダラ

分布訂正 宮古(宮古島, 伊良部島, 下地島)→宮古(伊良部島, 下地島)

p. 43 ミヤマカラスシジミ 1 行追加

= *ibukiensis* Futô et Murayama, 1990, *Nature Ins.* **25**(3): 33, figs 1, 2 (*Strymonidea* [sic]).

Type locality: “伊吹山 [Mt. Ibuki]”.

p. 44 ベニシジミ

C. Felder, 1862 → C. Felder, 1863

p. 44 クロシジミ

Bremer et Grey, 1852 → Bremer et Grey, 1853

p. 47 カクモンシジミ属

Leptotes Scudder, 1878 → *Leptotes* Scudder, 1876

p. 47 ヤマトシジミ subsp. *argia*

Murray, 1875 → Murray, 1874

分布追加 北海道

Distribution 追加 Hokkaido*

備考追加 北海道の記録は迷蝶または人為的移入とされる

p. 51 ルリシジミ

“Kobe, Japan” → “Kobé, Japan” (アクサンテギュを付ける)

分布追加 奄美 (喜界島)

p. 58 テングチョウ subsp. *amamiana*

Fruhstorfer, 1908 → Fruhstorfer, 1909

分布追加 奄美 (与論島)

p. 60 コウトウマダラ

原記載 figs 3, 3b → figs 3, 3bis

p. 63, 64 マルバネルリマダラ

亜種名の変更

subsp. *eunice* (Godart, 1819) →

subsp. *oculata* (Moore, 1883)

Moore, 1883, *Proc. zool. Soc. Lond.* **1883**: 302 (Salpinx). Type locality: "Philippines (Mindanao)".

国外分布 フィリピン, ミクロネシア, → フィリピン.

Distribution Philippines, Micronesia. → Philippines.

備考 フィリピンの亜種 *eunice* → フィリピンの亜種 *oculata*

p. 64 ツマムラサキマダラ

分布追加 本州 (埼玉県, 千葉県, 和歌山県)

p. 66 オオゴマダラ subsp. *clara*

Neetaria → *Nectaria*

分布追加 本州 (静岡県)

- p. 66 ホソバヒョウモン
Hübner, 1806 → Hübner, [1804]
- p. 67 ヒョウモンチョウ
(M. Okano, 1951) → M. Okano, 1951
(*Argynnis*) → (*Brenthis*)
- p. 68 ミドリヒョウモン属
Fabricius, 1907 → Fabricius, 1807
- p. 68 メスグロヒョウモン
分布追加 八重山 (与那国島)
備考追加 与那国島での記録は迷蝶と考えられる.
- p. 69 クモガタヒョウモン
Bremer, [1865] → Bremer, 1864
parasoides → *prasoides*
- p. 69 オオウラギンヒョウモン
= *coreana* Butler, 1882 の Type-locality
"Corea; Hakodadi" → "Posiette Bay, N.E. Corea; Hakodaté"
- p. 71 カバタテハ
pallidior の Type locality "Formosa" → "Yunan[Yunnan], Agra(India)"
- p. 73 トラフタテハ
Fruhstorfer, 1898 → Fruhstorfer, 1899
- p. 73 オオミスジ
Bremer et Grey, 1852 → Bremer et Grey, 1853
- p. 74 フタスジチョウ
bergmanni → *bergmani*
- p. 75 コミスジ
Fruhstorfer, 1913 → Fruhstorfer, 1912
- p. 75 イシガケチョウ
分布追加 本州 (群馬県)
- p. 75 スミナガシ族
Pseudoergolini → Pseudergolini

p. 77 キミスジ属

Hübner, 1819 → Hübner, [1819]

p. 79 コヒオドシ

備考追加 東北地方（青森県，秋田県．．．）

p. 81 イワサキタテハモドキ

分布追加 八重山（波照間島）

p. 82 コノハチョウ

acerifolia の項 (*Kallima*) → (f. of *Kallima inachus eucerca*)

p. 83 リュウキュウムラサキ

jacintha → *iacintha*

iacintha の項に追加：Note: *jacintha* incorrect subsequent spelling.

kezia Type locality “N. Formosa” → ”Northern Formosa”

pricilla → *priscilla*

priscilla Type locality “N. Formosa” → ”Northern Formosa”

p. 89 ジャノメチョウ

分布追加 八重山（石垣島）

備考追加 石垣島に記録は迷蝶あるいは人為的な移入.

p. 90 ヒメヒカゲ

annulifera → *annulifer*

謝辞

間違いや不備を指摘いただいた青木一宰・青嶋健文・Gerardo Lamas・西山保典・岡野喜久磨の各氏に御礼を申し上げます.